

Crassulaceae



Son herbáceas, anuales o perennes. Hojas enteras, alternas, opuestas o verticiladas, suelen ser generalmente crasas. Flores actinomorfas en inflorescencia, rara vez aparecen aisladas. Sus frutos son polifolículos.

- *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy
- *Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC.
- *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger
- *Sedum tenuifolium* (Sibth. & Sm.) Strobl

Crassulaceae



Nombre Científico *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Nombre Común Sombrerillo, Ombligo de Venus

Ecología Herbácea perenne crasa con tallos de 5 a 40 (-60) cm. Inflorescencias en racimo o panícula, con flores péndulas, amarillentas o rojizas. Fruto folículo. Florece de abril a junio. Es muy frecuente en muros, grietas de rocas, cortezas de árboles y tejados.

Usos Presenta propiedades medicinales como analgésico, antiséptico, astringente, cicatrizante, depurativo y para quemaduras leves. Se usa para combatir la diabetes y la hipercolesterolemia. Es dañino para los animales.

Crassulaceae



Nombre Científico *Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC.

Nombre Común Sombrerillo, Ombligo de Venus

Ecología Herbácea perenne crasa, con tallos de 8 a 36 (-50) cm. Inflorescencia en racimo, rara vez en panícula, con flores cilíndricas, horizontales y pardas. Fruto folículo. Florece de abril a junio. Habita en grietas de rocas preferentemente calcáreas. No es muy frecuente.

Usos No se le conocen usos populares.

Crassulaceae



Nombre Científico *Mucizonia hispida* (Lam.) A. Berger

Nombre Común

Ecología

Herbácea anual con tallos de 6 a 15 (-18) cm. Hojas verdes teñidas de rojo, subcilíndricas-aplanadas. Presenta inflorescencias pubescente-glandulosas con flores azul violeta claro, frecuentemente con estrías longitudinales más oscuras. Fruto tipo folículo. Florece de abril a junio. Habita en roquedos y muros.

Usos

No se le conocen usos populares.

Crassulaceae



Nombre Científico *Sedum tenuifolium* (Sibth. & Sm.) Strobl

Nombre Común

Ecología

Herbácea perenne crasa con tallos estériles de 2 a 12 cm, con hojas densas; y tallos fértiles de 12-35 (-50) cm, con hojas laxas. Presenta flores amarillas con nervio medio frecuentemente rojizo. Fruto tipo folículo. Florece de abril a julio. Habita en lugares áridos, matorrales, grietas de rocas y paredes. Presentes en todo el territorio.

Usos

No se le conocen usos populares.